CUESTIONARIO NUMERO 36

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA:

VACUNA FRENTE A ROTAVIRUS

1. El infección por *rotavirus* ocurre principalmente en niños:
 - a) Mayores de 5 años de edad
 - b) Entre los 3 meses a los 2 años de edad
 - c) Menores de 3 meses de edad
 - d) Entre 2 años y 5 años de edad
 - e) Todas las anteriores

2. La vacuna Rotateq, se administra:
 - a) Una dosis
 - b) Dos dosis
 - c) Tres dosis
 - d) Cuatro dosis
 - e) Ninguna de las anteriores

3. La vacuna Rotarix, para producir una buena respuesta inmunológica, se requiere de
 - a) Una dosis
 - b) Dos dosis
 - c) Tres dosis
 - d) Cuatro dosis
 - e) Ninguna de las anteriores

4. En general, se recomienda administrar la primera dosis de las vacunas aprobadas:
 - a) No antes de las 6 semanas o después de las 12 semanas de vida
 - b) Antes de las 6 semanas de vida
 - c) Después de las 12 semanas de vida
 - d) Entre las 12 semanas y 24 semanas de vida
 - e) Ninguna de las anteriores

5. Contraindicaciones de la vacunas frente a *rotavirus*
 - a) Historia previa de invaginación intestinal
 - b) Malformación intestinal
 - c) Lactante con infección asintomática por virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
 - d) Inmunodeprimidos
 - e) Todas las anteriores

Respuestas Cuestionario # 36

Respuestas:

1. b
2. c
3. b
4. a
5. e