

CUESTIONARIO NUMERO 38

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA: TRATAMIENTO DEL DOLOR EN NIÑOS

1. **El dolor se clasifica, de manera práctica en:**
 - a. Dolor nociceptivo: somático y visceral
 - b. Dolor neuropático
 - c. Dolor mixto ó coexistente
 - d. Dolor psicógeno
 - e. Todos los anteriores

2. **La escala de Susan Givens Bell, aporta una asociación bastante útil diferentes tipos de signos:**
 - a. Signos conductuales
 - b. Signos fisiológicos
 - c. Signos neurologicos
 - d. Ninguna de las anteriores
 - e. Son correctas a) y b)

3. **En el dolor leve y moderado los medicamentos no opiáceos son los de elección, que son:**
 - a. Paracetamol, ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno y dipirona
 - b. Morfina, ketorolaco, diclofenaco, e ibuprofeno y dipirona
 - c. Paracetamol, ketorolaco, fentanil, ibuprofeno y dipirona
 - d. Paracetamol, ketorolaco, diclofenaco, ketotifeno y dipirona
 - e. Ninguna de los anteriores

4. **El control del dolor debe ser considerado como un componente esencial del tratamiento oncológico y los analgésicos opiáceos potentes deben ser utilizados. Estos son:**
 - a. Paracetamol, dipirona e ibuprofeno
 - b. Dipirona, morfina y tramadol
 - c. Morfina, codeína y tramadol
 - d. Paracetamol, ibuprofeno y tramadol
 - e. Ninguna de las anteriores

5. **El opiáceo de elección es la morfina y la dosis recomendada es:**
 - a. 0,15 – 0,3 mg cada 4 a 6 horas
 - b. 0,3 – 0.45 mg cada 4 a 6 horas
 - c. 0,45 – 0,6 mg cada 4 a 6 horas
 - d. 0,6 – 0,9 mg cada 4 a 6 horas
 - e. Ninguna de las anteriores

Respuestas Cuestionario # 38

Respuestas:

1. e
2. e
3. a
4. c
5. a