

EDUCACION CONTINUA EN PEDIATRIA

CUESTIONARIO NUMERO 43

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA: EVALUACION Y MANEJO DE LA EXPOSICIÓN PERINATAL AL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)

Responde verdadero o falso en las siguientes aseveraciones:

1. Los factores de riesgo que incrementan el porcentaje de TMH son: carga viral materna elevada, recuento bajo de células CD4+ en la madre, avanzada enfermedad materna, prematuridad, ruptura prolongada de membranas, modo de alumbramiento, infección materna primaria y lactancia materna.

V

F

2. Se debe realizar el tamizaje de VIH a toda mujer, tan pronto como se confirme su embarazo y en caso de ser negativo, se debería repetir la prueba al tercer trimestre en aquellas mujeres con alto riesgo de adquirir nuevas infecciones durante el embarazo.

V

F

3. El diagnóstico de infección por el VIH en los niños menores de 18 meses requiere el uso de pruebas serológicas, ya que el empleo de pruebas de detección de anticuerpos (serología) determina el estado de infección en esta población.

V

F

4. La infección se excluye definitivamente con tres pruebas virológicas negativas, siendo la primera al primer mes de edad, la segunda al cuarto mes de edad y la tercera a los 18 meses de edad.

V

F

5. Todos los recién nacidos expuestos al VIH deben recibir profilaxis con zidovudina, para disminuir la transmisión perinatal; este debe iniciarse lo más cercano al nacimiento, idealmente antes de las primeras 12 horas de vida y continuarse hasta el día 42 de vida (6 semanas) a una dosis de 2mg/kg/dosis por vía oral cada 6 horas.

V

F

Respuestas Cuestionario # 43

Respuestas:

1. V
2. V
3. F
4. F
5. V