Propiedades fisicoquímicas trascendentes de los ácidos grasos. Ver tabla 1.

Tabla 1
Propiedades fisicoquímicas de los ácidos grasos

Comportamiento anfipático:	La cadena alifática del ácido graso tiene características hidrofóbicas (insoluble en agua), mientras que el extremo donde está el grupo carboxilo tiene características hidrofílicas (soluble en agua). Dispersándose en el agua y formando micelas (partícula compuesta exteriormente por sustancias solubles en agua formando una estructura esférica que transporta sustancias hidrófobas en su interior como medio de transporte celular).
Punto de fusión:	Es dependiente de la longitud de la cadena alifática y número de insaturaciones (dobles enlaces).
Esterificación:	Los ácidos grasos al reaccionar con alcoholes, (reacción de adición sobre el grupo carboxilo) producen ésteres. RCOOR'.
Saponificación:	Por hidrólisis alcalina, forma sales orgánicas solubles (jabones). RCOOM.
Auto-oxidación:	Los ácidos grasos insaturados debido a la influencia de los dobles enlaces sobre los enlaces contiguos pueden adicionar oxígeno, causando deterioro organoléptico y nutricional de los comestibles de donde provienen.

Fuente: Elaboración propia, sobre información de [3], [5]

Esta última propiedad limita la conservación natural de productos comestibles de alto contenido en (ÁGI)⁵, debido a la suma del oxígeno singulete⁶ sobre la cadena alifática, con la gravedad que una vez iniciada la auto-oxidación y al no detenerla, ésta continúa hasta deteriorar totalmente el producto (rancidez oxidativa⁷). [5]

En consecuencia, las procesadoras de comestibles con alto contenido (ÁGI) aplican procedimientos físicos para preservar las características de éstos, tanto en procesos de planta como en el producto final (filtrando el aire que ingresa al recinto de producción, incluyendo atmósfera de nitrógeno, envasado especial al vacío y en recipientes color ámbar) entre los más importantes. Sin embargo, cuando no es posible aplicar estos procedimientos físicos masivos y/o las condiciones económicas no lo permiten, es recomendable el uso de aditivos naturales o sintéticos (antioxidantes) para detener la auto-oxidación de (AGI), y Así, prolongar la vida útil de estos productos. [3]

Establecido este marco referencial, en el presente artículo de conocimiento y vinculación tecnológica, se considera brevemente aspectos relacionados con:

- La auto-oxidación química de (AGI).
- El efecto antioxidante de compuestos fenólicos primarios, utilizados para conservar comestibles con alto contenido en (AGI).

⁵ Aceites comestibles de diferentes vegetales y semillas, leche y sus derivados, cacao, pescados, carnes avícola, porcina, y comestibles procesados que incluyen lípidos.

⁶ El oxígeno molecular singlete, es una especie activada y reacciona especialmente con los dobles enlaces (reacciones de adición). Su química es diferente a la del oxígeno triplete. [6]

⁷ Degradación de los AGI, y formación de peróxidos o hidro-peróxidos que posteriormente se polimerizan y descomponen en aldehídos, cetonas y ácidos de menor peso molecular influyen sobre el sabor y olor, además de producir la alteración de las vitaminas liposolubles A, y E. [3]

- Los procedimientos experimentales para determinar la estabilidad oxidativa (periodos de inducción) de materiales lipídicos sin y con adición de antioxidantes fenólicos.
- El agregado de sustancias sinergistas que añadidas junto con los antioxidantes, sirven para prolongar aun más la vida útil de comestibles lipídicos de alto contenido en AGI.
- Perspectivas futuras de uso industrial.

DESARROLLO

Auto-oxidación de AGI en los lípidos

- En una publicación de la revista Trans. Faraday. Society. (Farmer, E.H., Bloomfield, G.G., Sundraligam, S., y Sutton, D.A, 1942), dieron una explicación del cómo se produce la auto-oxidación⁸ en materiales lipídicos, estableciendo para este propósito, un mecanismo cinético de reacción con tres etapas: de iniciación, propagación y terminación. [7]
- Investigaciones posteriores de: (Grosch, 1987), (Porter, y col.1995), (Brimberg Kamal-Eldin 2003), (Frankel, 2005), (Choe y Min, 2007), (Schneider, 2009), (Hammond y White, 2011), (Barden y Decker, 2016) entre otros, establecieron que la auto-oxidación lipídica, generan peróxidos (ROOR') e hidroperóxidos (ROOH) orgánicos, a partir de reacciones en cadena involucrando radicales libres por rupturas de enlaces homolíticos en la estructura alifática del (AGI). Sitios donde el oxígeno se adicione y prosiga afectando otras estructuras lipídicas [8]. Ver cuadro 2.

Iniciación: $RH \rightarrow R\cdot + H\cdot$	K_1 Depende de las condiciones energéticas y estereoquímicas favorables para la formación de radicales RL
--	---

Propagación:

$R\cdot + O_2 \rightarrow ROO\cdot$	$K_2 = 10^9 \text{ m}^{-1}\text{s}^{-1}$ reacción rápida
$ROO\cdot + RH \rightarrow ROOH + R\cdot$	$K_3 = 10^{-6} \text{ m}^{-1}\text{s}^{-1}$ Muy lenta
$RO\cdot + RH \rightarrow ROH + R\cdot$	K_4 Limita la propagación de RL
Multiplicación: $ROOH \rightarrow RO\cdot + OH\cdot$ K_5 Peroxidación formación de radicales por escisión molecular, R. endérgica o de energía libre positiva (no espontánea)	
$2ROOH \rightarrow RO_2\cdot + RO\cdot + H_2O$ K_6 Formación de radicales por reacción bimolecular requiere altas concentraciones de O_2 , R. exérgica o de energía negativa (espontánea)	
Terminación: Reacciones entre radicales para formar productos estables	

Ácido	Activación radicalaria*	Formación peróxidos	Productos descomposición, 1 ^{era} generación**
Oleico	8,9,10 y 11	4	16
Linoleico	11 doblemente activado	2	8
Linoléico	11 y 14	4	16

* Átomo (s) de hidrógeno en carbono (s)
** Aldehídos, cetonas oxoácidos, dienos conjugados principalmente

Fuente: Elaboración propia, sobre información de [3], [5], [8]

Cuadro 2: Mecanismo de reacción peroxidación lipídica y resultados sobre tres de los más importantes AGI

⁸ Reacción iniciada por el oxígeno (agente oxidante) sobre los AGI lipídicos.

Factores cinéticos que influyen sobre la auto-oxidación de AGI lipídicos, ver tabla 2.

Tabla 2
Auto-oxidación de AGI lipídicos, influencia de factores

Influencia del grado de insaturación sobre la cinética química:	Cuanto mayor número de dobles enlaces tiene el AGI, aumenta considerablemente la velocidad de auto-oxidación.
Geometría:	Mayor oxidación de AGI libres o cuando no están esterificados (triglicéridos).
Estado electrónico preferido del oxidante:	Triplete ³ O ₂ , iniciador de radicales libres en condiciones adecuadas de T, P y catalizadores. Singlete ¹ O ₂ , (electrofilico). Muy reactivo sobre los enlaces vecinos a los dobles enlaces del AGI.
Temperatura:	Directamente proporcional: $V_R \propto \Delta T$ A muy altas temperaturas la velocidad de reacción disminuye, por ser el oxígeno menos soluble.
Contacto del AGI con trazas de metales:	Especialmente el Cu y el Fe favorecen la formación de radicales en la cadena alifática y la descomposición peroxidica.
Efecto fotoquímico:	La energía luminica contribuye a formar: radicales libres alquilo, hidrógeno, peróxidos e hidroperóxidos.
Efecto del agua (actividad acuosa AW):	a) AW > 4 la capa mono nuclear evita el intercambio de O ₂ . b) AW < 4 acelera la auto-oxidación. c) 0,4 > AW > 0,8 aumenta la oxidación. d) AW > 0,8 disminuye la auto-oxidación (hidratación y dilución de reactivos).
Contacto del AGI con productos específicos denominados antioxidantes:	En concentraciones muy pequeñas: Tanto fenoles mono o polihídricos y compuestos insaturados disminuyen la velocidad de auto-oxidación. En concentraciones altas: actúan a favor de la auto-oxidación.

Energía de disociación del átomo de hidrógeno en (kJ.mol⁻¹) de acuerdo con la estructura de carbonos vecinales

422 	322
410 	272

Cuanto mayor número de dobles enlaces vecinales en la estructura alifática, la energía de disociación del enlace C-H es menor, favoreciendo la reacción radicalaria

Fuente: Elaboración propia, sobre información de [5], [11]

Antioxidantes

La preservación de comestibles frente a la rancidez, es un significativo ejemplo de larga data, que demuestra cómo, los saberes empíricos y los conocimientos científicos han contribuido en la implantación de una práctica industrial, centrada en la mezcla, disolución, contacto o aspersión de

la materia lipídica con sustancias naturales o compuestos químicos⁹ que manifiestan propiedades antioxidantes. Al respecto, los párrafos siguientes ofrecen un compendio de eventos relacionados con este tema:

- Wright, en 1852, vio como los originarios del valle de Ohio (USA) preservaban grasa de oso, usando las cáscaras del castaño de Ohio. 30 años después, fue patentado como un antioxidante. [3]
- En Francia en el siglo XIX observaron que al mezclar resina de benjuí y yemas de álamo con manteca animal, se evitaba la rancidez. [3]
- En el Japón investigando sobre la rancidez de los aceites de pescado, relacionaron este daño con la oxidación lipídica de triglicéridos insaturados. [3]
- Émile Duclaux en 1896, planteó sobre bases experimentales que el oxígeno atmosférico, era el causante de la oxidación de ácidos grasos libres provenientes de los lípidos. [9]
- Charles Dufraisse y Charles Moureu, desde 1921 y en años posteriores, iniciaron las primeras investigaciones sobre la auto-oxidación y las propiedades antioxidantes de alrededor 500 sustancias naturales y compuestos químicos, fundando un modelo investigativo experimental que se extendió por el mundo y tiene vigencia para buscar e identificar agentes que retrasen la auto-oxidación lipídica de los comestibles. [10]

Antioxidantes sintéticos fenólicos

En el cuadro 2, se tienen representaciones formulars de los antioxidantes fenólicos de mayor uso industrial para extender la vida útil de los comestibles y mantener control temporal de la rancidez oxidativa de AGI lipídicos, y en la tabla 3, se describen aspectos generales de estos cuatro antioxidantes.

<p>Nombre IUPAC: Mezcla de 2-terbutil-4 hidroanisol y 3-terbutil-4 hidroanisol Nombre Común: (Hidroxisoleno butilado) Aditivo número guía: E-320</p> <p>Abreviatura: BHA</p>	<p>Nombre IUPAC: 2, 6 - bis (1, 1dimetiletil)-4-metilfenol Nombre Común: (Hidroxitolueno butilado) Aditivo número guía: E-321</p> <p>Abreviatura: BHT</p>
<p>Nombre IUPAC: n-propilo 3, 4, 5 trihidroxibenzoato Nombre Común: (Galato de propilo) Aditivo número guía: E-310</p> <p>Abreviatura: GP</p>	<p>Nombre IUPAC: 2-(1, 1dimetiletil)-1, 4-benzenodiol Nombre Común: (Terbutilhidroquinona) Aditivo número guía: E-319</p> <p>Abreviatura: TBHQ</p>

Fuente: Elaboración propia, sobre información de [3], [11]

Cuadro 2: Representaciones formulars antioxidantes fenólicos utilizados mayoritariamente para evitar la auto-oxidación de AGI lipídico

⁹ Del extenso grupo de agentes inhibidores de la auto-oxidación lipídica, sólo algunos son aptos para consumo humano, por lo que en su selección es necesario tener en cuenta lo siguiente [11]:

- La eficacia de cantidades muy pequeñas (0,001 a 0,01%),
- Ausencia de cambios en el color, olor, sabor y otras características del comestible,
- Compatibilidad con el comestible y su fácil aplicación,
- Estabilidad en las condiciones del proceso y almacenamiento,
- El compuesto y sus productos de oxidación no pueden ser tóxicos, aún, si la dosis es mucho mayor a la que normalmente se ingiere en el comestible.
- Otros factores: legislación, costo, preferencia por antioxidantes naturales.

Tabla 3
Aspectos generales Antioxidante: BHA, BHT, TBHQ y GP

	BHA	BHT**	TBHQ	GP
Estado	Sólido ceroso	Sólido granular	Sólido granular	Sólido granular
Solubilidad En:	Aceites, grasas y alcoholes	Grasas	Aceites, grasas, y alcoholes	Aceites
Límite de adición	Conc. Total <<< 0,2 %*	Entre 0,01 a 0,02 %*	Menor al 0,02 %*	Menor al 0,01 %*
* Respecto al peso de lípidos que tiene el comestible				
Aprobación Internacional de uso	FDA Food and Drug Administration UE Comunidad Europea y Food Chemical Codex IV.			
Vigencia de uso	Desde la década del 40			
Seguridad alimentaria	Por debajo del límite inferior de uso, no se han reportado problemas de salud en humanos <i>Sin embargo los NIH-USA (Institutos Nacionales de Salud USA) consideran que estos antioxidantes con anticipada razón pueden ser carcinógenos [19]</i>			
Principal aditivo para:	Material lipídico derivado de la leche, procesados de cacao	Productos horneados, fritos, cereales procesados	Aceites vegetales, leche en polvo	Aceites vegetales excepto aceite de oliva

** Resistente al calor y alta temperaturas

Fuente: Elaboración propia, sobre información de [3], [5], [11], [12]

Comportamiento químico de antioxidantes fenólicos

Los antioxidantes fenólicos primarios se caracterizan por detener la auto-oxidación lipídica (etapa de propagación), a través de la ruptura radicalaria de su grupo funcional y la deslocalización electrónica por resonancia en el anillo aromático conjugado. Produciendo dos reacciones:

- Radicales hidrógeno para hidroperoxidar radicales peróxido,

- Radicales antioxidante que reaccionan con el exceso de radicales peróxido y forman productos estables que no alteran significativamente las propiedades organolépticas y/o nutricionales de comestibles con alto contenido en AGI.

Fuente: Elaboración propia, sobre información de [3], [5], [11], [13]

Cuadro 3: Estabilización de peróxidos por reacción con antioxidantes

El mecanismo involucrado para impedir la propagación de radicales peróxidos por reacción y adición en la estructura del antioxidante (deslocalización por resonancia de anillo aromático conjugado), se muestra en el cuadro 3.

Antioxidantes fenólicos y estabilidad oxidativa

Descritos los aspectos cinéticos de auto-oxidación AGI, y el comportamiento antioxidante que exhiben estos cuatro compuestos fenólicos primarios, de uso frecuente y actual en la conservación de materiales lipídicos industriales con alto contenido en AGI. También es importante conocer la respuesta experimental que tienen los materiales lipídicos, frente a la estabilidad oxidativa proporcionada tanto por antioxidantes determinados (efectividad), o combinados con otros extractos vegetales y/o antioxidantes naturales¹⁰ (sinergismo).

Para medir la estabilidad oxidativa, es necesario seguir en función del tiempo la auto-oxidación del material lipídico simple (prueba de control) y acompañado por adiciones mínimas pero variable de antioxidantes en estudio. Diseño experimental que fija el período de inducción, equivalente al tiempo transcurrido para conseguir señales visibles de un consumo mayor en oxígeno, vertiginoso aumento en la concentración de peróxidos y compuestos derivados de la intensa y libre auto-oxidación. [3], [13]

Durante el periodo de inducción, la auto-oxidación AGI en su etapa de propagación se detiene, porque los radicales peróxido, reaccionan con los radicales de las estructuras antioxidantes añadidas y conforme éstas van concediendo sus centros activos, el periodo de inducción termina. En consecuencia, llegado ese momento, el material lipídico pierde la protección del antioxidante aumentando así la auto-oxidación, que se refleja en la serie de productos de reacción (análisis fisicoquímico y químico posterior) [14].

El periodo de inducción puede ser evaluado por medio de la respuesta experimental que manifiestan los materiales industriales,¹¹ cuando éstos son expuestos a condiciones de investigación especiales que aumentan la velocidad de auto-oxidación. Al respecto, los procedimientos actuales más utilizados para medir y evaluar estabilidad oxidativa y periodos de inducción, son los siguientes:

a) Ohmímetro Rancimat

Mide la estabilidad oxidativa del material lipídico, a través de una muestra que se confina en un recinto cerrado con temperatura regulable entre 50 a 220 °C, y por la cual se hace pasar oxígeno en aire a presión atmosférica. Bajo estas condiciones, la variable fisicoquímica de observación y medida corresponde al aumento en la conductividad eléctrica alcanzada, después de solubilizar los productos volátiles formados durante la auto-oxidación en el colector VOC, donde inicialmente se tiene un de volumen líquido específico con baja conductividad (agua desionizada).

La conductividad es registrada y graficada continuamente para obtener series temporales (conductividad-tiempo) ascendentes, caracterizadas por puntos de inflexión que señalan la finalización de los periodos de inducción, y es a partir de este punto, que se incrementa la conductividad eléctrica del colector VOC, indicando la desprotección del material lipídico. En la figura 1, se muestra un esquema básico del colector de productos volátiles VOC – ohmímetro y su desarrollo para medidas automáticas con opción de interfaz, como lo hace el equipo (Metrohm Rancimat 743), A más de un modelo gráfico (seguimiento y tratamiento de datos) para determinar los periodos de inducción.

¹⁰ Principalmente tocoferoles, flavonoides, xantofilas y carotenoides.

¹¹ Comestible provisto de material lipídico y el o los respectivo(s) antioxidante(s).

Fuente: Elaboración propia, sobre información de [11], [13], [14], [15] y [16]

Figura 1: Colector VOC- ohmímetro, instrumental de medida e interfaz (Rancimat 743), ejemplo gráfico: seguimiento y tratamiento de datos para determinar factores de actividad

b) Oxidación a presión alta OXIPRES

Por este procedimiento se logra oxidar rápidamente una muestra de material lipídico al introducirlo en el frasco de vidrio, contenido en la cámara hermética y suministrar oxígeno a presión (>5 bar = 4,935 atm), fijando además la temperatura de los ensayos entre 90 a 120°C. Estado inicial de condiciones que se aprovecha para medir y registrar variaciones de presión, originadas por consumo de oxígeno durante la auto-oxidación.

Por lo que la cámara hermética (bomba de oxígeno) en unión con el transductor de presión¹² detecta los cambios en la atmósfera interior, y envía estas señales a un grabador que las convierte y grafica en series temporales de (presión-tiempo), marcando tres sectores: 1) Ascenso proporcional de presión con el aumento de temperatura, 2) estabilidad de la presión final, y 3) caída brusca de presión, relacionada con la desprotección del material lipídico frente a la acción del oxígeno. La figura 3, muestra tres equipos Oxipres Mikrolabm AARHUS.DK para muestras simultáneas, la bomba de oxígeno a alta presión y temperatura de ensayo, más el rastreo gráfico para fijar los periodos de inducción, en función de la caída de presión diferencial en el sistema.

¹² Sensor de presión de gases o líquidos que genera una señal (neumática o eléctrica) diferente en función de la presión a la cual está sometido.

Fuente: Elaboración propia, sobre información de [13], [14], [15], [17] y [20]

Figura 2: Instrumental Oxipres Mikrolab AARHUS.DK, esquema bomba de oxígeno y seguimiento gráfico periodo de inducción (decaimiento presión diferencial del sistema)

Agregados sinérgica¹³

No presentan acción antioxidante específica, no obstante, su añadido tiene la capacidad de aumentar la efectividad del antioxidante primario¹⁴. El comportamiento se explica a través de los dos mecanismos siguientes:

1) Antioxidante primario A_xH y agregado sinérgica A_sH , ambos con afinidad química diferente por radicales peróxido

A_sH reacciona lentamente con radicales peróxido, en especial por impedimento estérico. Así, los radicales antioxidante $A_x\cdot$, pueden reaccionar con A_sH para regenerar A_xH . [11]

2) Acción combinada aceptor de radicales peróxido A_xH y un QH_q secuestrador de metales :

Aportando al medio ácido para la estabilidad de los antioxidantes fenólicos, e inhibiendo la acción catalítica de iones metálicos (Cu y Fe) sobre la peroxidación lipídica, (ecs.1 y 2). [11]

En la tabla 4, se dan a conocer algunos pares frecuentes de uso industrial: antioxidante fenólico primario - agregado sinérgica.

¹³ Pertenciente o relativo a la sinergia: Acción de dos o más causas que producen un mayor efecto al que se produce por adición de los efectos individuales.

¹⁴ Sin embargo, combinaciones adecuadas de antioxidantes primarios pueden también manifestar un comportamiento sinérgico. El caso más importante es la combinación de BHA y BHT en la conservación de procesados de cacao (chocolates). [3]

Tabla 4
Pares frecuentes de uso industrial:
Antioxidante fenólico primario - Agregado sinérgico

Antioxidante. fenólico primario	Agregado sinérgico*	Mecanismo
Hidroxi anisol butilado (BHA)	Ác. tiodipropiónico	1
Hidroxi anisol butilado (BHA)	EDTA**	2
Hidroxi tolueno butilado (BHT)	Ácido ascórbico***	1
Tetrabutyl hidroquinona (TBHQ)	Lecitina ¹	1
Galato de propilo (GP)	Ác. tiodipropiónico	1

* También denominados antioxidantes secundarios. ** Ácido etilendiaminotetracético
 *** Vitamina C o palmitato de ascorbilo. ¹ fosfatidilcolina (fosfolípido natural).

Fuente: Elaboración propia, sobre información de [3], [11], y [13]

Uso de antioxidantes BHA, BHT, PG y TBHQ

Si bien, el procedimiento vigente de aplicación industrial de antioxidantes fenólicos sintéticos desde hace 79 años, establece que son inofensivos para el consumo humano, siempre y cuando las cantidades de antioxidantes en los comestibles se mantengan por debajo de las tolerancias permitidas. Pruebas de laboratorio usando como variable de observación la ingesta de comestibles procesados con estos antioxidantes por especies animales menores, les atribuyen el desarrollo de procesos descontrolados en la división de las células del cuerpo (cáncer) [18], [19]. Resultado que está sirviendo de alerta para investigar con sustitutos naturales o mezclas combinadas que permitan reducir las cantidades límites de adición, o descarten los usos futuros de los antioxidantes fenólicos sintéticos.

La apertura de este nuevo campo de investigación sobre auto-oxidación de materiales lipídicos, incluye pruebas de estabilidad oxidativa, incorporando extractos vegetales de composición fenólica¹⁵ simple y compleja con potenciales propiedades antioxidantes. [3]

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto, se puede compendiar el estado de arte a partir del conocimiento fisicoquímico y aplicación industrial de antioxidantes fenólicos frente a la oxidación lipídica (rancidez), de la siguiente manera:

- Se conoce que el origen de la rancidez lipídica se debe al oxígeno atmosférico, y la peroxidación radicalaria generada se descompone principalmente en productos de primera generación: (dienos conjugados, aldehídos) que después desarrollan a dialdehídos, y compuestos cíclicos.
- Es posible controlar temporalmente la oxidación, usando los antioxidantes fenólicos sintéticos: E-320 (BHA), E-310 (GP), E-321 (BHT) y E-319 (TBHQ), en las dosificaciones máximas límite permitidas (tolerancias de adición).
- Se conoce cómo el antioxidante de matriz fenólica natural o sintético, protege el material lipídico frente a la peroxidación.
- Se puede experimentar y controlar la cinética de oxidación lipídica, aplicando procedimientos experimentales (rancimat y oxipres), que evalúan la estabilidad oxidativa del material lipídico en función de la temperatura (procesos de inducción o tiempo de preservación del antioxidante), y en función a sus resultados, fijar tiempos de vida útil en almacenamiento de comestibles lipídicos con alto contenido en AGI.
- Aún manteniendo su vigencia por un largo tiempo (79 años) y teniendo aprobación de uso general por no afectar la salud

humana, se anticipa razonadamente que pueden dañar a ésta [18]. Motivo de alerta que ha originado abrir un nuevo campo de investigación, que busca respuesta experimental en relación al agregado de extractos vegetales de matriz fenólica simple o compleja (antes no tomados en cuenta) y su efecto en los materiales lipídicos (estabilidad oxidativa, tiempo de vida útil del comestible). Reportando importante información que aun siendo particular para materiales lipídicos determinados, no excluye su contribución en un procedimiento innovador que utilice antioxidantes naturales, reduciendo así, el actual uso de estos cuatro antioxidantes fenólicos sintéticos en las procesadoras de comestibles lipídicos con alto contenido en AGI. [3]

Referencias bibliográficas:

- [1] Koolman, J., Röhm, H.K., 2005, Bioquímica texto y atlas, Lípidos, pp: 46–48, Ed. Panamericana Médica, 3era edición, Madrid–España,
- [2] Berg, M, J., Tymoczko, L.J., Stryer, L, 2008 bioquímica, versión en español, Capítulo 12 Lípidos y membranas celulares, pp: 326–320, ISBN: 978842917006-1, Barcelona–España,
- [3] Ramalho, V., Neuza, J., 2005, Antioxidantes utilizados em óleos, gorduras e alimentos gordurosos, Quim. Nova, Vol. 29, No. 4, 755-760, 2006, Sociedade Brasileira de Química, Brasil– São José do Rio Preto – SP, Recuperado de: quimicanova.sbq.org.br/default.asp?ed=83,
- [4] Ácido araquidónico, origen, propiedades, usos y funciones, <https://acidos.info/>araquidónico>, consulta: 10/02/2019,
- [5] Castañeda, M., Deterioro de lípidos, auto-oxidación, Recuperado de: depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/2Lipidos-2_24644.pdf,
- [6] Recuperadonde: https://es.wikip.org/w/index.php?title=Oxígeno_tripleto&oldid=101023393
- [7] Mechanism of the reactions of oxygen with fatty materials. Advances ... <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02645889> De Saussure, Ann. chim. et Phys. [2]13, 337... Farmer, E. H., Bloomfield, G. F., Sundralingam, A., and Sutton, D. A., Trans. ... George, P., and co-workers, Nature149, 601 (1942); Trans. Faraday Soc.42, 210 and 217 (1946); Proc. Roy. Soc.,
- [8] García, M. MC., 2018, oxidación lipídica en productos lácteos: influencia de la adición de ácidos grasos funcionales, Tesis, p: 18, Universidad Autónoma de Madrid, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (CSIC), España,
- [9] <https://es.wikip.org/wiki>Émile>, Consulta 21/02/2019,
- [10] Citados por Meurant, G., 2012, Atmospheric oxidation and antioxidants, p:5, <https://books.google.com.bo>books>, Consulta 21/02/2019,
- [11] Antioxidantes - depa.fquim.unam.mx depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/8-Lipidos6_26590.pdf
- [12] CODEX STAN 192-1995, Ggeneral standard for food additives, Recuperado de: www.fao.org/gsaonline/docs/CXS_192e.pdf
- [13] Castañeta, M., Peroxidación de lípidos - depa.fquim.unam.mx Recuperado de: depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/lipidos-4_24710.pdf,
- [14] Andrade, A. P., 2017, Metodología novedosa para la evaluación del tiempo de vida de alimentos con alto contenido en grasa, Recuperado de: lacongress.aocs.org/.../Presentations/Andrade.pdf,
- [15] Carné, S., Estévez, J., Evaluación de la oxidación y la protección antioxidante en materias primas & pienso, Recuperado de: www.itpsa.com/images/stories/pdfs/antioxidantes,
- [16] www.metrohm.com/.../stability-measurement/rancimat
- [17] Mmikrolab.dk/amfile/file/download/file_id/131817/-Højbjerg-Denmark
- [18] www.portalantioxidantes.com/faq/ ¿Existe riesgos asociados al consumo crónico de antioxidantes sintéticos?, Consulta: 23/02/2019,
- [19] IARC – International Agency for Research on Cancer, www.iarc.fr
- [20] Prime, D., antioxidants- fish meal and feed, april 2018 Recuperado de: sfs.is>Antioxidants-Vitablend-David-Prime.pdf,

¹⁵ Destacando por ejemplo los extractos de: **oregano** (timol), **romero** (carnosol), **salvia** (ácido carnósico), **carotenoides** (vitamina A), **perejil** (flavonoides), **argán** (derivados cinámico – ácido cafeico), **sésamo**, **espárragos** (alfa tocoferoles componentes principales de la vitamina E). Según la importante información académica (publicaciones) que viene reportando este nuevo campo de investigación. [3], [8]