

CASO CLÍNICO 2: ODONTOLOGÍA

ALVEOLECTOMIA¹

DANEY RODRIGUEZ CRESPO, DANAY² ; FLORES RICARDO³



Daney Rodríguez Crespo

Nombre del paciente: EAH

Edad: 23 años

Nº. H.C: 890817

Estado civil: Soltero

Procedencia: Potosí

Nivel socioeconómico: Bajo

Nacionalidad: Boliviano

Ocupación: Albañil

ALVEOLECTOMÍA PIEZA 14

Examen clínico: Resto radicular con pérdida total de la corona, rodeado de abundante placa bacteriana, encía irritada de coloración rojiza, debido a la inflamación se observa la reabsorción ósea horizontal y oblícuca.

Diagnóstico clínico: Periodontitis periapical crónica con pérdida total de la corona.

Tratamiento: Exodoncia con alveolectomía y prótesis parcial fija.



1 Anestesia tópica en spray



2 Antisepsia con alcohol yodado



3 Anestesia infiltrativa (técnica dentarios medios con cierre de circuito por palatino)



4 Incisión con mango de bisturí # 3 y hoja # 15

1 Caso Clínico presentado en Internado Rotatorio de Odontología. UCEBOL
2 Estudiante del décimo semestre de la carrera de Odontología. UCEBOL
3 Docente asesor. Mgs. Odontología. Carrera de Odontología UCEBOL



5 Levantamiento del colgajo con el periostótopo de punta roma



6 Resección de la tabla vestibular con bastante irrigación y con fresa fisura de carburo



7 Luxación de la pieza 14 con elevador recto



8 Extracción con fórceps para restos radiculares



9 Curetaje del alvéolo



10 Irrigación con suero fisiológico



11 Puntos de sutura



12 Fotografía final. Formación de coágulo natural y los puntos de sutura



13 Postoperatorio a los 5 días después de la cirugía.

Alveolectomía es la operación con la cual se elimina un órgano dentario previa resección de la tabla ósea que lo recubre, la ventaja es de reducir el trauma quirúrgico y realizar en el menor tiempo posible.

INDICACIONES AL PACIENTE

- Dieta blanda y líquida
- No realizar esfuerzos físicos
- No fumar ni consumir bebidas alcohólicas
- Realizar crioterapia
- No realizar enjuagues o buches fuertes por las primeras 12 a 24 horas

Se citó al paciente para el retiro de puntos dentro de 5 días y para eliminar otro foco infeccioso que presenta en la cavidad bucal.